



RR-0829

Third Year B. Sc. Examination

March / April – 2010

Mathematics : Paper - VIII

(Numerical Analysis) (New Course)

Time : 3 Hours]

[Total Marks : 70

સૂચના :

(૧)

નીચે દર્શાવેલ નિશાનીવાળી વિગતો ઉત્તરવહી પર અવશ્ય લખવી.  
Fillup strictly the details of signs on your answer book.

Name of the Examination :  
T. Y. B. Sc.

Name of the Subject :  
Mathematics - 8 (New)

Subject Code No. : 0 8 2 9 Section No. (1, 2,.....): Nil

Seat No. :

Student's Signature

- (૨) જમણી બાજુના અંક પ્રશ્નના ગુણ દર્શાવે છે.  
(૩) પ્રયક્તિત સંકેતોને અનુસરો.  
(૪) "Scientific Non-programmable Calculator"નો ઉપયોગ કરવો.

૧ માગ્યા મુજબ જવાબ આપો :

૧૦

(૧) નીચેની સંખ્યાઓને બે દશાંશ સ્થળ સુધી સરખી કરો :

(i) 52.275 (ii) 7.865

(૨) નીચેની સંખ્યાઓને ચાર સાર્થક અંક સુધી સરખી કરો :

(i) 2.36459 (ii) 0.0022218

(૩) નિરપેક્ષ ત્રુટિની વ્યાખ્યા આપો.

(૪) સાપેક્ષ ત્રુટિની વ્યાખ્યા આપો.

(૫) 'કમિકોની રીત' સફળ બને તે માટેની શરત જણાવો.

(૬) સાબિત કરો કે :  $\Delta \equiv E\sqrt{\quad}$ .

(૭) સાબિત કરો કે :  $\mu\delta \equiv \frac{1}{2}(\Delta + \nabla)$ .

(૮)  $(x, y)$ ની આપેલ  $(n + 1)$  જોડ  $(x_i, y_i) : i = 0, 1, 2, \dots, n$  માટેનું 'લાગ્રાન્જનું અંતર્વેશન સૂત્ર' જણાવો.

(૯) જો  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  હોય તો વિભાજિત અંતર  $[a, b]$ ની કિંમત શોધો.

(૧૦) સિમ્પસનના  $-\frac{1}{3}$  - નિયમમાં ત્રુટિ જણાવો.

- ૨ (અ) સમીકરણ  $f(x) = 0$ ના વાસ્તવિક બીજ મેળવવાની 'ક્રમિકોની રીત' ૪  
સમજાવો. તેની અસફળતાની બે આકૃતિઓ દોરો.
- (બ) બે સંખ્યાઓના ગુણાકાર  $a \cdot b$ માં નિરપેક્ષ ત્રુટિ શોધો; જ્યાં  $a = 56.54$  ૪  
તથા  $b = 12.4$  છે.
- (ક) સમીકરણ  $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ ના વાસ્તવિક બીજને ૪  
'દુભાજક પદ્ધતિ'થી શોધો.

**અથવા**

- ૨ (અ) 'દુભાજક પદ્ધતિ'ની અભિસારી વર્ણવો. ૪
- (બ) (૧) જો  $x = 0.51$  એ બે દશાંશ સ્થળ સુધી સાચી હોય, તો સાપેક્ષ ૪  
ત્રુટિ શોધો.
- (૨) જો  $\pi$ ની અંદાજિત કિંમત  $X_1 = 3.1428571$  આપવામાં આવી હોય  
અને તેની સાચી કિંમત  $X = 3.1415926$  છે, તો નિરપેક્ષ તથા સાપેક્ષ  
ત્રુટિ શોધો.
- (ક) સમીકરણ  $f(x) = x^3 + x^2 - 1 = 0$ ના વાસ્તવિક બીજને 'ક્રમિકોની ૪  
રીત'થી શોધો.

- ૩ (અ) સમીકરણ  $f(x) = 0$ ના વાસ્તવિક બીજ શોધવા માટેનું 'ન્યૂટન-રાફ્સન ૪  
સૂત્ર' મેળવો. તેની અસફળતાને આકૃતિ દ્વારા સમજાવો.
- (બ) સમીકરણ  $f(x) = x^3 - 2x - 5 = 0$ ના વાસ્તવિક બીજને 'મિથ્યા-સ્થાન ૪  
પદ્ધતિ'થી મેળવો.
- (ક) સાબિત કરો કે : ૪

$$(૧) \quad \nabla \equiv \delta E^{-\frac{1}{2}};$$

$$(૨) \quad u_x - \Delta^n u_{x-n} = u_{x-1} + \Delta u_{x-2} + \Delta^2 u_{x-3} + \dots + \Delta^n u_{x-n}$$

**અથવા**

- ૩ (અ) સાબિત કરો કે 'ન્યૂટન-રાફ્સન પદ્ધતિ'માં અભિસારીની કક્ષા 2 છે. ૪
- (બ) સમીકરણ  $f(x) = x^3 - 25 = 0$ ના વાસ્તવિક બીજને 'ન્યૂટન-રાફ્સન ૪  
પદ્ધતિ'થી મેળવો.
- (ક) સાબિત કરો :

$$(૧) \quad \Delta - \nabla \equiv \delta^2;$$

$$(૨) \quad \Delta^n u_{x-n} = u_x - n u_{x-1} + \frac{n(n-1)}{2!} u_{x-2} + \dots + (-1)^n u_{x-n}.$$

૪ (અ) 'ન્યૂટનનું પ્રગતાન્તર અંતર્વેશન સૂત્ર' મેળવો. ૪

(બ) આપેલા કોષ્ટક પરથી  $f'(0.12)$  શોધો : ૪

$x :$	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
$y = f(x) :$	0.1003	0.1511	0.2027	0.2553	0.3093

(ક) આપેલા કોષ્ટક પરથી 60 અને 70 વચ્ચે ગુણાંક મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા શોધો : ૪

$x = \text{ગુણાંક} :$	0-40	40-60	60-80	80-100	100-120
$y = \text{વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા} :$	250	120	100	70	50

અથવા

૪ (અ) 'ન્યૂટનનું વિભાજિત-અંતર અંતર્વેશન સૂત્ર' મેળવો. ૪

(બ) 'ન્યૂટનના વિભાજિત-અંતર અંતર્વેશન સૂત્ર'નો ઉપયોગ કરી, કોષ્ટકની કિંમતોનું સમાધાન કરતી બહુપદી શોધો : ૪

$x :$	0	1	3	4	6
$y = f(x) :$	7	8	34	71	223

(ક) 'લાગ્રાન્જના અંતર્વેશન સૂત્ર'નો ઉપયોગ કરી કોષ્ટકની કિંમતોનું સમાધાન કરતી બહુપદી  $f(x)$  મેળવો અને તે પરથી  $f(1)$  શોધો :

$x :$	0	3	4
$y = f(x) :$	12	6	8

૫ (અ) 'ગોસનું પૃષ્ઠાંતર અંતર્વેશન સૂત્ર' મેળવો. ૪

(બ) જો  $f(25) = 0.2707$ ,  $f(30) = 0.3027$ ,  $f(35) = 0.3386$  તથા ૪

$f(40) = 0.3794$  હોય, તો 'ગોસના પ્રગતાન્તર અંતર્વેશન સૂત્ર'નો ઉપયોગ કરી  $f(32)$  શોધો.

(ક) 'બેસલના અંતર્વેશન સૂત્ર'નો ઉપયોગ કરી, નીચેના કોષ્ટક માટે  $f(25)$  મેળવો : ૪

$x :$	20	24	28	32
$y = f(x) :$	24	32	35	40

અથવા

- ૫ (અ) પ્રચલિત સંકેતોમાં સાબિત કરો કે : ૪

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \frac{1}{h} \left[ \Delta y_0 - \frac{1}{2} \Delta^2 y_0 + \frac{1}{3} \Delta^3 y_0 - \frac{1}{4} \Delta^4 y_0 + \dots \right]$$

- (બ) નીચેના કોષ્ટક પરથી,  $x=3.5$  આગળ  $\frac{d^2y}{dx^2}$  શોધો : ૪

$x :$	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
$y = f(x) :$	3	9	18	28	40

- (ક) 'ગોસના પૃષ્ઠાંતર અંતર્વેશન સૂત્ર'નો ઉપયોગ કરી, નીચેના કોષ્ટક પરથી ૪  
વર્ષ 1946માં વસ્તી વધારો શોધો :

$x = \text{વર્ષ} :$	1931	1941	1951	1961	1971
$y = \text{વસ્તી (લાખમાં)} :$	15	20	27	39	52

- ૬ (અ) 'સિમ્પસનના  $-\frac{1}{3}$  -નિયમ'ને મેળવો. ૪

- (બ) 'સમલંબકના નિયમ'નો ઉપયોગ કરી,  $h = 0.125$  લઈ,  $I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x}$  ની ૪  
કિંમત મેળવો.

- (ક) પ્રારંભિક મૂલ્ય પ્રશ્ન :  $\frac{dy}{dx} = -y$  ;  $y(0) = 1$  નો ઉકેલ,  $h = 0.01$  લઈ, ૪  
'ઓઈલરની પદ્ધતિ'થી  $y(0.04)$  શોધો.

અથવા

- ૬ (અ) પ્રારંભિક મૂલ્ય પ્રશ્ન :  $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  ;  $y(x_0) = y_0$  ને ઉકેલવા માટે ૪  
'પિકાર્ડની આસાદાન પદ્ધતિ' સમજાવો.

- (બ) 'ઓઈલરની સંશોધિત પદ્ધતિ'થી પ્રારંભિક મૂલ્ય પ્રશ્ન ૪

$$\frac{dy}{dx} = x^2 + y ; y(0) = 1 ; \text{નો ઉકેલ, } h = 0.05 \text{ લઈ, } y(0.05) \text{ની કિંમત}$$

શોધો.

- (ક) 'પિકાર્ડની આસાદાન પદ્ધતિ'નો ઉપયોગ કરી, પ્રારંભિક મૂલ્ય પ્રશ્ન ૪

$$\frac{dy}{dx} = 1 + xy ; y(0) = 1 ; \text{નો ઉકેલ ત્રણ (૩) આસાદાન સુધી મેળવો.}$$

## ENGLISH VERSION

- Instructions :**
- (1) As per the instruction no. 1 of page no. 1.
  - (2) Figures to the **right** indicate marks of the question.
  - (3) Follow usual notations.
  - (4) Use of "Scientific Non-programmable Calculator" is allowed.

- 1** Answer as directed : **10**
- (1) Round-off the following numbers to two decimal places :  
(i) 52.275 (ii) 7.865
  - (2) Round-off the following numbers to four significant digits :  
(i) 2.36459 (ii) 0.0022218
  - (3) Define Absolute Error.
  - (4) Define Relative Error.
  - (5) State the condition for 'the Iteration Method' to succeed.
  - (6) Prove that :  $\Delta \equiv E\nabla$ .
  - (7) Prove that :  $\mu\delta \equiv \frac{1}{2}(\Delta + \nabla)$ .
  - (8) State the formula for 'Lagrange's Interpolation', when  $(n + 1)$  pairs  $(x_i, y_i) : i = 0, 1, 2, \dots, n$  of  $(x, y)$  are given.
  - (9) If  $f(x) = \frac{1}{x^2}$ , then find the value of the divided-difference  $[a, b]$
  - (10) State the error in the Simpson's  $-\frac{1}{3}$ - Rule.
- 2**
- (a) Explain 'the Iteration Method' to obtain a real root of the equation  $f(x) = 0$ . Draw two diagrams of its failure. **4**
  - (b) Find the absolute error in the product  $a \cdot b$ ; where  $a = 56.54$  and  $b = 12.4$ . **4**
  - (c) Find a real root of the equation  $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ , by 'The Bisection method'. **4**

**OR**

- 2 (a) Describe the convergence of 'The Bisection method'. 4  
 (b) (1) If  $x = 0.51$  is correct to two decimal places, then 4  
 find the relative error.  
 (2) If an approximate value of  $\pi$  is given by  
 $X_1 = 3.1428571$  and its true value is  $X = 3.1415926$ ,  
 then find the absolute and relative errors.  
 (c) Find a real root of the equation  $f(x) = x^3 + x^2 - 1 = 0$  4  
 by 'The Iteration method'.
- 3 (a) Obtain 'The Newton-Raphson Formula' to find a real 4  
 root of the equation  $f(x) = 0$ . Explain its failure by a  
 diagram.  
 (b) Obtain a real root of the equation  $f(x) = x^3 - 2x - 5 = 0$  4  
 by 'The Method of False-Position'.  
 (c) Prove that : 4  
 (i)  $\nabla \equiv \delta E^{-\frac{1}{2}}$ ;  
 (ii)  $u_x - \Delta^n u_{x-n} = u_{x-1} + \Delta u_{x-2} + \Delta^2 u_{x-3} + \dots + \Delta^n u_{x-n}$

**OR**

- 3 (a) Prove that the order of convergence of 'the 4  
 Newton-Raphson method' is 2  
 (b) Obtain a real root of the equation  $f(x) = x^3 - 25 = 0$  4  
 by 'The Newton-Raphson method'.  
 (c) Prove that : 4  
 (1)  $\Delta - \nabla \equiv \delta^2$ ;  
 (2)  $\Delta^n u_{x-n} = u_x - n u_{x-1} + \frac{n(n-1)}{2!} u_{x-2} + \dots + (-1)^n u_{x-n}$ .

- 4 (a) Derive 'Newton's - Forward - Difference Interpolation 4  
 Formula'.  
 (b) Using the following table find  $f(0.12)$  : 4

$x :$	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
$y = f(x) :$	0.1003	0.1511	0.2027	0.2553	0.3093

- (c) For the given table, find the number of students, 4  
 who have obtained marks between 60 and 70 :

$x = \text{Marks} :$	0 - 40	40 - 60	60 - 80	80 - 100	100 - 120
$y = \text{No. of students} :$	250	120	100	70	50

**OR**

4 (a) Derive 'Newton's Divided - Difference Interpolation Formula'. 4

(b) Using 'Newton's Divided - Difference Interpolation Formula', obtain a polynomial  $f(x)$ , satisfying tabular values :

$x :$	0	1	3	4	6
$y = f(x) :$	7	8	34	71	223

(c) Using 'Lagrange's Interpolation Formula', obtain a polynomial  $f(x)$  satisfying tabular values and hence find  $f(1)$  : 4

$x :$	0	3	4
$y = f(x) :$	12	6	8

5 (a) Derive 'Gauss' Backward - Difference Interpolation Formula'. 4

(b) Using 'Gauss' Forward - Difference Interpolation Formula', find  $f(32)$  given that :

$$f(25) = 0.2707, f(30) = 0.3027, f(35) = 0.3386 \text{ and}$$

$$f(40) = 0.3794.$$

(c) Using 'Bessel's Interpolation Formula', obtain  $f(25)$ , for the given table : 4

$x :$	20	24	28	32
$y = f(x) :$	24	32	35	40

**OR**

5 (a) Prove, in usual notations, that 4

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \frac{1}{h} \left[ \Delta y_0 - \frac{1}{2} \Delta^2 y_0 + \frac{1}{3} \Delta^3 y_0 - \frac{1}{4} \Delta^4 y_0 + \dots \right]$$

(b) From the following table, find  $\frac{d^2y}{dx^2}$  at  $x = 3.5$  : 4

$x :$	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
$y = f(x) :$	3	9	18	28	40

- (c) Using 'Gauss' Backward - Difference Interpolation Formula', find the population in the year 1946; given that : 4

$x = \text{Year} :$	1931	1941	1951	1961	1971
$y = \text{Population (in Lakhs)} :$	15	20	27	39	52

- 6 (a) Derive 'Simpson's  $\frac{1}{3}$ - Rule'. 4

- (b) Evaluate  $I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x}$ , by using 'Trapezoidal Rule'; by taking  $h = 0.125$ . 4

- (c) Using 'Euler's method', by taking  $h = 0.01$ ; find  $y(0.04)$  for the Initial value problem 4

$$\frac{dy}{dx} = -y ; y(0) = 1$$

OR

- 6 (a) Explain 'Picard's Approximation method' to solve the Initial value problem  $\frac{dy}{dx} = f(x, y); y(x_0) = y_0$ . 4

- (b) Using 'Euler's Modified method' by taking  $h = 0.05$ ; find  $y(0.05)$  for the initial value problem : 4

$$\frac{dy}{dx} = x^2 + y ; y(0) = 1.$$

- (c) Using 'Picard's approximation method' to solve the initial value problem : 4

$$\frac{dy}{dx} = 1 + xy; y(0) = 1;$$

upto three (3) approximations.